© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Calyptraea sp.
Hipponyx Grayanus var.
Rissoina striata Mke.
Trochus (Omphalius) Cooksoni n. sp.
Fisurella obscura Sow.
Chiton (Lophyrus) Goodalli Brod.
— — sulcatus Wood.
Arca sp.

b. *Landmollusken.*

Bulimus nux Brod.
— unifasciatus Sow.
— eschariferus Sow.
Succinea Bettii n. hp.

Sämmtliche Arten stammen von Charles Island; sechs davon waren in der Inselgruppe noch nicht beobachtet.

Literaturbericht.

Proceedings of the Zoological Society of London. 1876. Part. IV.

p. 752. *Sowerby, G. B.*, Description of six new species of Shells from the collections of the Marchioness Paulucci and Dr. Prevost. (Conus Pauluceiae von Mauritius, superscriptus von Madagascar, baccatus und reflectus unbekannten Fundortes, Lima zealandica von Neuseeland, Cardium ornatum von Hongkong.)

Bullettino della Società malacologica italiana. Vol. II. 1876.

p. 67. Pini, Napoleone, Molluschi terrestri e d'acqua dolce viventi nel territorio d'Esino.

p. 207. Bellardi, L. Descrizione d'un nuovo genere della famiglia delle Bullide fossile (Sabatia).

p. 211. Brugnone, Ab. G., Osservazioni sulle Chemnitzia pusilla e Ch. terebellum.

p. 216. —, due specie fossili nuove de Altavilla (Drillia pseudosigma, Mitra De Stefanii).

p. 218. Adami, G. B., Molluschi dei Dintorni di Sassari in Sardegna. 49 Arten, darunter eigenthümlich Hyalina opaca, Helix corsica, parva, Claus. Meissneriana.

223. Paulucci, Marchesa, Osservazioni critiche sopra le specie del genere Struthiolaria Lam. Es werden nur die Lamarck-Deshayes'schen Arten, besprochen und ihre Synonymie klargelegt;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Str. crenulata sollte mit dem älteren Namen australis Gmel. heissen. Str. mirabilis Smith wird gar nicht erwähnt.

p. 233. Pantanelli, Dante, Catalogo dei Moluschi terrestri e fluviatili nel bacino del Maroggia (Spoleto).

p. 240. Tapparone Canefri, C., Intorno ad alcune Specie di Testacei marini mal conosciute e nouve dell' Isola 'Maurizio (Pisania luctuosa, Tritonium pachycheylos, mauritianum, Ranella Paulucciana).

Clessin, S., die tertiären Binnenccnchylien von Undorf. — In Regensb. Corresp. Bl. 1877 p. 34.

40 Arten, darunter neu Hyalina Böttgeriana, Helix subteres, Clausilia Schaefferiana, Strobilus costatus Sdbrgr., Limnaeus Undorfensis, Planorbis subfontanus, angulatus, Albertanus, Ancylus palustris.

Monterosato, A. de, Notizie sulle conchiglie della rada di Civitavecchia. — In Annali del Mus. Civ. di St. nat. di Genova, Vol. IX. p. 407.

182 Arten, darunter neu Cyclostrema catenoides und Turritella turbona, beide im Holzschnitt abgebildet. Für Patella Gussoni wird die neue Gattung Scutulum vorgeschlagen.

Moebius, Karl, die äusseren Lebensverhältnisse der Seethiere. Vortrag, gehalten auf der Naturforscherversammlung in Hamburg. — In Zoologischer Garten 1877 No. 2 p. 105.

Wir machen unsere Leser auf diesen interessanten, aber eines Auszugs nicht wohl fähigen Vortrag aufmerksam.

Dall, W. H., on the Californian Species of Fusus. — In Proceed. Calif. Acad. 19 March 1877.

Es werden erwähnt F. geniculus Conrad, fossil aus den miocänen Sandsteinen von Astoria, auf ein unbestimmbares, noch obendrein längst verlorenes Fragment gegründet und als vollkommen verschollen zu betrachten; damit fällt das Genus Priscofusus Conrad; — dasselbe gilt von dem auf einen Steinkern gegründeten F. corpulentus Conrad, der schwerlich in die Gattung gehört. — F. dirus Reeve (incisus Gould, Trit. sitchense Carp.), von Alaschka bis Monterey, F. ambustus Gould nec Carpenter = tumens Carp.; — F. Harfordi Stearns = ? Tritonium Sabinii Midd., non F. Sabini Gray, eine sehr seltene, seither nur unvollkommen bekannte Art, welche wohl zu Neptunea gehört; F. luteopictus Dall = ambustus Carpenter nec Gould = geniculus Gabb nec Conrad; — F. Kobelti n. sp.